

**Winterweizen – Sortenempfehlungen und Eigenschaften**

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	Züchter	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha, 2018 vorl.)			Anbauregionen						Eigenschaften				Qualität			Festigkeit gegen											
				2016	2017	2018	Marsch	Sandböden Nordwest	Sandböden Nordhannover	Lehmstandorte Nordwest	Lehmstandorte Südhannover	Höhenlagen Mitte/West	Ähren je m <sup>2</sup>	Körner je Ähre	TKG	Halm-länge (+=kurz)	RP-Gehalt	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Lager	Mehltau <sup>3)</sup>		Braunrost <sup>3)</sup>		Gelbrost <sup>3)</sup>		Blattseptoria	Halmbruch	DTR	Ährenfusarium	Auswinterung <sup>2)</sup>
<b>A</b>																															
RGT Reform	RAGT	2014	m	918	1.186	1.351	X	X	X	X	X	X	+	-	+	+	4	9	+	+	o	o	+	+	o	o	o	o	-	+	++
Kashmir	Syngenta	2016	m	-	4	79	P	P		P	P	o	o	+	+	4	8	+	-	++	++	+	o	-	-	-	-	-	o	o	
Rubisko (Gr)	Hauptsaat	EU	fr	27	53	29				FD	FD	+	o	+	+	4	5	1)	+	o	-	++	++	++	++	o	-	o	++	--	
Nordkap	Nordsaat/SU	2016	m	32	126	125						-	+	+	o	5	7	+	+	++	++	o	-	++	++	+	++	o	o	o	
Apostel	Streng/IG	2016	m	5	20	37						+	-	++	o	4	7	+	o	+	+	+	+	++	++	+	-	o	o	++	
<b>B</b>																															
Johnny	Secobra	2014	m	109	48	56	X			X		-	+	+	o	3	6	o	+	++	++	-	-	-	--	-	-	+	+	-	
Benchmark	Franck/IG	2015	m	485	681	680	X	X	X	X	(X)	+	o	o	o	2	7	+	o	+	+	--	o	o	-	-	+	o	o	-	
Bergamo	RAGT	EU	m	170	248	74	X	X	X	X	X	+	o	o	+	4	4	1)	+	--	--	o	o	++	o	o	-	o	+	o	
Bosporus	Breun/LG	2016	m	6	144	116			X		X	o	o	o	o	2	7	+	+	+	-	o	-	++	+	+	o	+	+	++	
KWS Maddox	KWS Getreide	2016	m	9	68	37		X	X	X	(X)	o	++	o	+	2	8	+	+	++	o	+	-	o	+	o	+	o	-	--	
Porthus	Strube/SU	2016	m	33	27	113	X, FD	FD	X, FD	X	(X)	++	o	-	o	3	7	+	-	-	-	o	-	++	++	+	-	o	++	-	
Faustus	Strube/SU	2015	fr	293	340	488	X, FD	X, FD	X, FD	FD	X, FD	+	+	-	o	2	7	+	o	-	--	-	--	++	++	o	-	o	+	o	
KWS Talent	KWS Getreide	2017	m	6	168	229	P	P	P	P	P	o	+	o	o	2	7	+	o	+	+	++	o	++	++	o	-	+	o	++	
Rumor	Strube/SU	2013	fr	354	239	129	FD	FD	FD	FD	FD	++	o	-	o	3	6	o	-	o	+	o	o	o	++	o	o	-	+	+	
<b>C</b>																															
Elixer	NPZ/SU	2012	m	368	430	231	X					o	+	-	o	3	6	+	-	-	--	-	--	+	++	o	o	-	+	+	
Anapolis	Hauptsaat	2013	m	554	528	205		(X)				o	o	+	++	4	3	-	+	++	++	o	-	++	+	o	+	o	++	-	
Sheriff	ISZ/Secobra	2016	m	-	47	18	X					+	+	-	+	1	7	+	o	++	+	o	o	o	-	+	o	+	1)		
Expert fr.	Hauptsaat	EU	m	51	90	28	FD			FD		o	o	+	+	1)	1)	1)	+	o	/	-	/	o	/	o	/	-	+	o	

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich - = unterdurchschnittlich 1) = noch nicht ermittelt bzw. eingestuft (x) = eingeschränkte Empfehlung  
 2) = Bonituren der LFA aus MV bei dort geprüften Sorten miterücksichtigt FD = Frühdrusch GR = begrannt  
 3) = vorläufige Einstufung für das aktuelle Jahr 2018  
 Ausprägungsstufe Note 1 = sehr gering, Note 9 = sehr stark Reifezeit: fr = früh, m = mittel, mfr = mittelfrüh, msp = mittelspät